

# ホクロ除去CO2レーザー同意書

妊娠中・授乳中は不可

## □レーザーの効果

CO2(炭酸ガス)レーザーは、水にエネルギーが吸収されて、水分のある組織を蒸散させます。ホクロ除去後の傷を最小限にするため、深さは真皮浅層までにしています。ホクロの細胞は、表皮および真皮に分布しています。

## □レーザーのリスク

1. 通常1回では取りきれず、小さくとも10回以上かかることがあります。
2. 浅めに照射していますが、それでも傷として陥凹してしまうことがあります。
3. ホクロの細胞が深い位置にある場合、レーザーが届かず最終的に灰色になって残る可能性があります。深い位置に色素が残る場合、液体窒素療法（保険診療）へ変更することもあります。それでも灰色が取り切れないことがあります。

## □レーザー照射までの流れ

1. レーザーの適応（直径4mm以下、隆起していない）があるか判断します。
2. 痛みに弱い方は麻酔のシール（95円税別）を貼ります。麻酔アレルギーのある方は教えて下さい。
3. レーザーを照射します。深さは真皮の浅いところまでです。

## □レーザー後の経過

1. 直後；照射部分は陥凹し、周囲は炎症で赤くなります。
2. 翌日；薄いかさぶたになります。
3. 1～2週間後；かさぶたが剥がれ、皮膚が薄いためやや凹んで、ピンク色になります。
4. 1～2ヶ月後；その後人によって、炎症後の色素沈着が生じる場合がありますが、徐々に消えていきます。  
人によっては、6ヶ月くらいかかる場合があります。
5. 傷の状態；目立たなくなるまで、6ヶ月くらいかかります。

## □レーザー後の処置

1. 直後～3日目；レーザーによる炎症を抑えるために、ステロイド軟膏(560円税抜)を塗ります。
2. 4日目～かさぶたが取れるまで；細菌感染を予防するため抗生素軟膏(560円税抜)を塗ります。
3. かさぶたが取れた後～；特に処置はいりません。

## □残存している場合の再照射

1ヶ月以上間隔をあけて、再照射します。

## □再発の可能性について

ホクロの構造上、細胞が残っている場合があります。その場合、何年かして出てくる可能性があります。

何か気になる事があれば、すぐに再診して下さい。当クリニックの診療時間外の場合は、お近くの救急外来に電話をかけ、受診して下さい。

## 税別価格

1つ目(1回目)	2つ目(2回目)	3つ目(3回目)	4つ目(4回目)
10,000円	5,000円	4,000円	3,000円

上記内容について、同意します。

日付； 年 月 日

ご署名；